

## Инструкция по применению

**Концентрация:** 150 гр. Пигипро Милк для приготовления 1 литра молока. Порошкообразный продукт постепенно добавляют в 1/3 нужного объёма чистой воды с температурой 50-55° С°. Хорошо перемешать. После равномерного растворения продукта добавить оставшуюся часть воды, для достижения рекомендуемой концентрации и температуры выпаивания (40° С).

Пигипро Милк может использоваться в качестве заменителя молока свиноматки. Им можно выпаивать поросят в случае, если свиноматка умерла или при слишком большом количестве поросят.

Очень важно обновлять корм дважды в день, соблюдать гигиену при содержании животных и чистоту кормушек для поросят.

**До отъема:** поросятам давать Пигипро Милк вволю

**После отъема:** Пигипро Милк давать наряду с сухим кормом, но не больше 0,5 л в день на поросёнка. После Пигипро Милк давать воду.

**Поросятам сиротам:** После рождения сразу дать молозиво. Пигипро Милк должен быть доступен в маленьких порциях, постепенно увеличивать до 2 л. максимум в день на поросёнка. После Пигипро Милк давать воду Сухой корм с 10 – го дня жизни.

### ВАЖНО

- Кормите предпочтительно при 40°С, но не менее чем при комнатной температуре
- Используйте только чистую, и свежую воду
- Тщательно чистите все оборудование каждый день
- Каждый поросенок должен получить достаточное количество молозива в первые часы жизни

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ Пигипро Милк 150 г / л	ИНСТРУКЦИИ
	A. 300 г. Пигипро Милк + 1 л. воды 40°-45° С
	
	B. Смешайте в течение 5 мин.
	
	C. Смешайте и добавьте остальную часть воды (2 - 2,5 л)
	
	D. Пигипро Милк 37° - 39°С – готов к употреблению
	