



**Schils**

**ЗАМЕНИТЕЛЬ МОЛОКА ДЛЯ ПОРОСЯТ**

**ПИГИ ПРО МИЛК**



## **КОРМЛЕНИЕ МОЛОЗИВОМ**

- Незамедлительно после рождения
- Содержит анти-тела (Гамма-глобулин)
- Появляется пассивный иммунитет
- Иммуноглобулины – Лактоген антитела
- Здоровый поросенок пьет примерно 200 г молозива в день



## Концентрация протеина (г/л)




Схема: изменения в концентрации иммуноглобулинов в молоке свиноматки в течение 42 дней лактации (приведено из Klobasa и др. 1987)

# Требования для заменителей молока для поросят



- Стабильность в растворе
- Постоянство в составе
- Слегка подкислен
- Питательная ценность (Вит./Мин./...)
- Легко усваиваемый
- Подходящий для поросенка

# Пиги Про милк



## Заменитель молока для поросят

### ПАРАМЕТРЫ

Постоянное качество, высокая растворимость, высокое содержание молочных ингредиентов первого сорта, оптимальная усвояемость, специально отобранное сырье

### СТАНДАРТНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


- Протеин (Мин.) 22,00%
- Жир (Мин.) 14,00%
- Влага (Макс.) 5,00%

# График кормления Пиги про Милк



В общем – свободный доступ

Постепенно поросята должны начать питаться престартерными гранулами, которые можно давать в корм с 10-14 дня и далее. От времени отнятия поросята съедают около 1 литра молока + престартер. Кормление молоком может быть прекращено после отнятия.



— Гранулы престартера  
— Пиги-Плюс

# Инструкции по кормлению/ Инструкции по смешиванию



Концентрация: 150 г на литр смешанного молока

При смешивании добавить требуемое количество порошка до приблизительно 1/3 необходимого объема воды. Хорошо перемешать и довести до требуемого объема холодной водой.

- ПЕРЕД ОТНЯТИЕМ

Предлагать пороссятам на свободном доступе.

- ПОСЛЕ ОТНЯТИЯ

Может быть предложен параллельно сухому корму. Потребление не должно превышать 0.5 литров на поросенка в день.

После дневного рациона молока, должна быть предложена вода.

- ПОРОСЯТА-СИРОТЫ

Заменитель молока должен быть легкодоступным в маленьких количествах в начальной стадии, постепенно увеличиваться до максимум 2 литров в день на поросенка.

После употребления молока, должна быть предложена вода.

Твердый корм должен быть предложен с 10 дня.