



## Схема кормления заменителями молока Schils (индивидуальная выпойка из ведра)

Недели	Порошок гр/литр	Порция/литр	Кратность/день	Примечание
День 1-2	Молозиво	1,50 *	до 4 раз	Скорость качество, количество
День 3-7	125	1,50	(2) до 3	С 5 дня: вода
2	125	2,50	2	Вода, Комбикорм
3	125	3,00-4,00	2	Вода, комбикорм, сено/солома
4 - 6	125	3,00-4,00	2	Вода, комбикорм, сено/солома
7	125	3,00	2	Вода, комбикорм, сено/солома
8	125	2,50	2	Вода, комбикорм, сено/солома
9	125	2,00	2	Вода, комбикорм, сено/солома
10	125	2,00	1	Вода, комбикорм, сено/солома

\* по возможности в течении первых 6 часов после рождения скормить 4 литра молозива

### Обратить внимание:

- ЗЦМ растворять при температуре 45° - 50°C
- Температура выпойки: 38° до 42°C
- Для определения концентрации решающим является общий объем смеси!!!  
Например: 1 литр ЗЦМ = 140 гр порошка + 860 мл воды.
- Ежедневно предлагать свежую питьевую воду.
- При снижении окружающей температуры <0°C, объем скармливаемой смеси ЗЦМ увеличивать на 10%

**Схема выпойки это рекомендация.  
Определяющим является развитие и состояние животных!!**



**Schils**

Schils bv  
Dr. Nolenslaan 121  
6136 GM Sittard  
The Netherlands  
T +31 (0)46 45 99 900  
F +31 (0)45 45 99 999  
Info@schils.com  
www.schils.com

## Схема кормления в молочную фазу на основе ЗЦМ Евролак (для автоматических систем)

Возраст	1 литр + грамм ЗЦМ	Литров в сутки	Комментарий
1. день	Молозиво	4-6 л	
2. день	Молозиво	3 x 1,5	
3. день	Молозиво	3 x 1,5	
4 – 10 день	Молоко цельное	3 x 1,5	Вода, мюсли
10-15 день			Формирование групп
2 – 3 неделя	150	увеличение с 4,5 л\день до 6 л\день	Вода, TMR (гранулы, солома, патока)
3-4 неделя	150	увеличение с 6 л\день до 8 л\день	Вода, TMR (гранулы, солома, патока)
4 – 7 неделя	150	постоянно 8 л\день	Вода, TMR (гранулы, солома, патока)
8 – 10 неделя	150	снижение с 8 л\день до 0	Вода, TMR (гранулы, солома, патока)

### Контроль:

- Установка концентрации на автомате из расчёта 150 гр. порошка ЗЦМ + 1 литр воды
- Смешивание ЗЦМ при температуре 45° до 50°С
- Температура кормления: 39° до 43°С
- Группы формировать из расчёта 15 голов на соску, животные должны быть сформированы по росту\массе. Группы формируем только из здоровых животных, без признаков диареи.
- Перед формированием в группы последнюю индивидуальную выпойку сделать раствором электролита.
- Обеспечить доступ к теплой, чистой воде. Ежедневная чистка поилок.
- 1 x раз в месяц проводить калибровку автомата, и заменять поврежденные соски.
- 1 x раз в 2 месяца заменять шланги