

Пигипро Милк

заменитель свиноматочного молока



При повышенном многоплодии свиноматок (>10) возникает проблема недостаточного и неравномерного питания поросят из-за недостаточной молочности свиноматок в первые дни после опороса, малого количества удобных для получения молока сосков и повышенной конкуренции за них среди поросят.

Высокая нагрузка на подсосную свиноматку также приводит к сильной потере веса, отсутствию охоты и, как следствие, удлинению цикла воспроизводства. Для сохранения максимального количества живорожденных поросят, их ускоренного роста и снижения потери веса свиноматкой рекомендуется использовать заменитель свиноматочного молока (ЗСМ) **ПигиПроМилк**.

Результаты исследований показывают, что при использовании заменителя свиноматочного молока получены следующие результаты:

Число пометов	16	16	
Поросят/помет	12	12	
На момент отъема	10,90	11,40	+4,6 % (снижение смертности)
Вес при рожд., кг.	1,58	1,58	
Вес при отъеме, кг	5,69	6,60	+16 % (вес при отъеме)
Среднесуточный привес, г	192	236	+44 г
Смертность, %	9,4 %	5,2 %	
Потребление на помет, кг	0,00	11,96	

Потребление корма свиноматкой, кг

1 неделя	5,54	5,41	
2 неделя	5,14	5,55	
3 неделя	4,91	5,12	
Потеря веса свиноматки, кг	20,3	16,9	+16 %
Дней до 100 кг	146	143	меньше на 3 дня

Пигипро Милк

Инструкция по применению

150 г **Пигипро Милк** использовать для приготовления 1 литра молока. Продукт постепенно добавляют в 1/3 нужного объёма чистой воды с температурой 50-55°C. Хорошо перемешать. После растворения продукта добавить оставшуюся часть воды для достижения температуры выпаивания (40°C) и перемешать.

Очень важно обновлять корм трижды в день, соблюдать гигиену при содержании животных и чистоту кормушек для поросят.

До отъема:

Поросятам давать Пигипро Милк вволю с 3-4 дня жизни начиная с 2-2,5 л на гнездо при 3х разовом кормлении до 4,5-5 л на гнездо к 22 дню жизни. Для получения лучших результатов рекомендуется увеличение концентрации до 190 г и увеличение количества раствора на 10-15% и повышение кратности кормлений в сутки или использование автоматических систем выпойки. В последнем случае дается 20-25 мл раствора ЗСМ на поросенка в час с 4-5 дня до 30-45 мл на поросенка в час к 22 дню.

После отъема:

Пигипро Милк давать наряду с сухим кормом, но не больше 0,5л в день на поросёнка.

Условия хранения

Хранить в прохладном, темном и сухом месте.
Всегда плотно закрывать мешок после использования.

Производитель – **Schils BV, Голландия**

Упаковка: 25кг крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем
Гарантированный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.



Типовой анализ

Протеин (N*6.38)	22 %
Жир	14 %
Лактоза	43 %
Влага	<5 %
Клетчатка	0,2 %
Зола	8 %
Лизин	1,5 %
Обменная энергия	16.65 МДж/кг

Витамины

Витамин А	25000 МЕ/кг
Витамин D3	6000 МЕ/кг
Витамин Е	150 мг/кг
Витамин В1	15 мг/кг
Витамин В6	3 мг/кг
Витамин В12	40 мкг/кг
Селен	0,15 мг/кг
Медь	2,5 мг/кг
Железо	100 мг/кг
Кобальт	0,5 мг/кг
Марганец	30 мг/кг
Цинк	30 мг/кг
Йод	5 мг/кг
Вид	светло-кремовый сыпучий порошок



420056, г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская д.1
Единая справочная ООО «КаМП» тел: +7 843 230-32-01
e-mail: info@kampkazan.ru